

ధూమపానంతో లంగ్కావున్నర్

లంగ్ క్వాస్టర్ పురుషుల్లో
ఎక్కువే అయినా స్టోకింగ్,

పొగాకు వాడకం, సెకండ్ హ్యాండ్ లేదా ప్యాసివ్
(బ్రాగ్ తాగే వారి పక్కను ఉండడం) స్టోకింగ్ వల్ల
గత కొన్నెళ్ళగా ఈ క్వాస్టర్ మహిణిల్లో కూడా కనిపిం
స్తోంది. సిగరెట్లలో రికి ప్లైగా క్వాస్టర్లకు దారి తీసే
నాలుగు వేలకు పైగా రసాయనాలు ఉంటాయి.
లంగ్ క్వాస్టర్కు ఇతర అవయవాలకు వ్యాపించే
గుణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. లంగ్ క్వాస్టర్కు పొగ
తాగడం ఒక కారణమైతే, రేడాన్ గ్రౌస్, ఆనజెస్ట్రోన్,
వాతావరణ కాలుశ్శు పంచిచి ఇతర కారణాలు.
తీవ్రతను బిభీ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

నేడు వరల్డ్ టుబాక్స్ డే

కాలం వీలైనంత ఉపశమనం దమ్మలూ
'పాలియెబ్లెవ్ కేర్ అందిస్తారు.

వివారణ

పొగతాగడం మానెయడంతో పాటు పొగ తాగేవా
రికి దూరంగా ఉండాలి. అలాగే వాతావరణ కాలు
ప్యాసివ్, నీటి కాలుప్యాసివ్ తగ్గించుకుంటే మన
లాగ్ని పదిలంగా ఉంటాయి. ఈపెరిమిత్తుల క్వాస్టర్,
క్షయ వ్యాధి లక్షణాలు ఒకేలా ఉంటాయి. కాబట్టి



సాధారణ లక్షణాలు ఇలా..

- ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా ఉండడం
- బాగా దగ్గర, దాంతో పాటు రక్తం పడడం
- ఆకలి, బయపు తగ్గడం, అలనట
- ఛాతీలో, పొట్లలో నోప్పి
- మింగడం కష్టంగా మారడం

లంగ్ క్వాస్టర్లో రకాలు

1. స్టోల్ సెల్ లంగ్ క్వాస్టర్ (ఎన్.సి.ఎల్.సి)
2. నాన్ సెల్ లంగ్ క్వాస్టర్ (ఎన్.ఎన్.ఎల్.సి)
3. క్వాస్టర్ వచ్చిన బాగం నుంచి ఇతర అవయవాలకు వ్యాప్తి చెందేవి

వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు

లక్షణాలు ఉన్నపారికి ముందుగా ఛాతీ ఎక్స్ట్రెంజ్
పాటు, బయప్పే, నీటి స్టోల్, పెట నీటి స్టోల్ పరి
క్షలు చేయవలసి ఉంటుంది. క్షయసు పరిక్రించడంతో
పాటు, ఊపిరితిత్తుల పనితీరును తెలిపే ప్లైరో
మెట్సీ లంగ్ను ఎండెస్స్కోఫ్టోలే పరిక్రించే ప్రాంకో
స్టోల్సే, రక్తపరికల పంచిచి చేసి, క్వాస్టర్ లంగ్లోని
ఏ ప్రాంతానికి స్టోకింగ్, దాని స్టేజ్, గ్రేడ్లను నిర్ధ
రించి, చికిత్స మొదలుపెడతారు.

చికిత్స ఇలా...

ముందుగా క్వాస్టర్సు గుర్తిస్తే, లోబ్జెక్టమీ చేసి
లంగ్లో క్వాస్టర్ వచ్చిన బాగాన్ని తెలిగిస్తారు. నాన్
స్టోల్ సెల్ క్వాస్టర్కు సర్కరి చేస్తారు. కానీ స్టోల్
సెల్ లంగ్ క్వాస్టర్కు ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందే
గుణం ఉంటుంది కాబట్టి రేడియోదెరపే, కీమో
పంచిచి ఎంత కాలం తీసుకోవలసి ఉంటుండి నిర్మ
యిస్తారు. పయసు పెద్దదై, క్వాస్టర్సు ఆలస్యంగా
గుర్తిస్తే, తీవ్రతను తగ్గించి, వారు బుతికి ఉన్నంత

పొరబడి, చికిత్స దారి తప్పే ప్రమాదమూ
ఉటుంది షైల్చోబ్యూలీరియం టూబుల్యులోనీస్
అనే బ్లౌటీరియా వల్ల వచ్చే టీబి, దగ్గర ద్వారా వ్యాపి
స్తుంది. క్షయ వ్యాధి ఉన్నపారికి చాలా దగ్గరగా
ఉన్నప్పుడు, ఈ బ్లౌటీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించి,
లోగిసోఫకశ్టీ తగ్గినప్పుడు వ్యాధి రూపంలో బయ
ల్యాముతుంది. కాబట్టి టీబికి గుద్దొనా, టీబితో బాదపడే
వారికి చేరువలో ఉన్నా, టీబి, ఇతర ఇన్వెక్షన్ స్టోకే
ప్రమాదం ఎక్కువ. కాబట్టి ఇళ్ళడ పేర్కొన్న లక్ష
ణాలు కనిపించినప్పుడు ముందుగా వ్యాధి నిర్ధారణ
పరీక్షలు చేయంచుకుని, అది టీబి అయినా, లేక
లంగ్ క్వాస్టర్ అయినా నిర్మక్కణ చేయకుండా
వెద్దుల నుండి మేరకు నిర్మితకలం పాటు చికిత్స
టీసుకోవాలి. చికిత్స మద్దలో ఆపకుండా, పూర్తి
కాలం పాటు కొనసాగించడం మంచిది. క్వాస్టర్
అయితే చికిత్స హర్షయాన తర్వాత కూడా వైష్యల
పర్యవేక్షణలో కొనసాగుతూ ఉండాలి.

డాక్టర్ మోహనవంశీ

చీఫ్ సిర్కిల్ అంకాలజ్స్,
బమేగా పోస్ట్స్టుల్స్,
హైదరాబాద్.

ఫోన్: 9848011421

